



Behandling med calciumantagonister

HANDELSNAVN: _____

Hvad er calciumantagonister?

Calciumantagonister bruges til behandling af svær Raynaud syndrom ("hvide fingre").

Hvordan virker calciumantagonister?

Calciumantagonister virker ved at udvide blodkarrene og øge tilførslen af blod til vævene. Dette nedsætter hyppigheden og sværhedsgraden af Raynaud anfald.

Hvordan foregår behandlingen?

Calciumantagonister gives som tabletter.

Behandlingen starter med en lav dosis, der over de følgende uger langsomt øges, så den rette dosis med færrest mulige bivirkninger tilpasses til dig.

Hvor længe gives behandlingen?

Hvis calciumantagonister har den ønskede effekt, varer behandlingen typisk i flere år.

Nogle personer kan sætte dosis ned eller holde pause med behandlingen om sommeren. Din gigtlæge vil sørge for at din behandling tilpasses til dig og dit behov.

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger ved behandling med calciumantagonister er hovedpine, almen utilpashed, forstoppelse og hævede ankler.

Desuden kan der forekomme svimmelhed, allergiske reaktioner, mavesmerter, ansigtsrødmen, synsforstyrrelser og lavt blodtryk.

Calciumantagonister nedbrydes hurtigt i kroppen og eventuelle bivirkninger forsvinder hurtigt ved at pausere behandlingen eller ved at nedsætte dosis. Du må ikke få calciumantagonister, hvis du

lider af meget lavt blodtryk, hvis du for nyligt har haft en blodprop i hjertet eller har svær hjertesygdom. Hvis du tidligere har haft svære overfølsomheds-reaktioner for calciumantagonister eller har en ileostomi (hvor tyndtarmen er ført ud gennem bugvæggen) skal du heller ikke have behandlingen.

En samlet oversigt over bivirkninger, kan du læse på indlægssedlen, som ligger i æsken med din medicin.

Blodtryksskontrol

Lavt blodtryk kan forekomme som en bivirkning til behandlingen. Vi anbefaler derfor, at du får målt dit blodtryk i forbindelse med opstart af behandlingen. Blodtryksmålinger kan foregå hos din egen læge eller hjemme ved dig selv, hvis du har et blodtryksapparat. Når du er i behandling med en fast dosis og ikke oplever bivirkninger, er det ikke længere nødvendigt med hyppige blodtryksskontroller.

Calciumantagonister og anden medicin

Du bør undgå grapejuice og tuberkulosemidlet rifampicin, når du får calciumantagonister.

Flere andre lægemidler kan øge din risiko for at få bivirkninger, hvis du tager dem sammen med calciumantagonister. Det drejer sig bl.a. om

- Blodtryksmedicin
- Visse svampemidler og midler mod HIV
- Erythromycin (antibiotika)
- Fluoxetin (depressionsmedicin)

Vi anbefaler, at du taler med din gigtlæge om hvilken medicin du ellers tager og om medicinen kan tages sammen med calciumantagonister.



Dansk
Reumatologisk
Selskab

Graviditet og amning

Calciumantagonister bør ikke tages i forbindelse med graviditet. Hvis du planlægger graviditet, bør du drøfte dette med din gigtlæge.

Tilskud

Der kan søges enkelt tilskud til behandlingen.

Yderligere spørgsmål?

Er du i tvivl eller har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte dit behandlingssted.